

Nawozy Wuxal w uprawie borówki wysokiej



początek wegetacji,
pierwsze liście



po ukazaniu
się pąków
kwiatowych



po kwitnieniu



wzrost
i dojrzewanie
owoców,
przed zbiorem

po zbiorach

NOWOŚĆ

Wuxal P45 1,5 l/ha

dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor

NOWOŚĆ

Wuxal K40 3-5 l/ha

dla polepszenia
kwitnienia i zapylenia
jak również **wzrostu**
odporności roślin
na choroby
i przymrozki

Wuxal Calcium 3 l/ha

dostarczenie
wapnia, zwiększenie
trwałości oraz
jędrności
owoców, następnie

Wuxal Boron 1-2 l/ha

dla zaopatrzenia
w niezbędne
mikroskładniki,
zabezpieczenie
przed przymrozkami

Wuxal Kombi 3-5 l/ha

jeżeli występuje potrzeba
uzupełnienia niedoborów
azotu +

Wuxal Mikro 1-2 l/ha

dla uzupełnienia niedoboru
mikroskładników

Wuxal Boron 2 l/ha

poprawa kwitnienia,
zapylenia,
wpływ na zawiązanie
owoców

Wuxal Kombi 3-5 l/ha

+
Wuxal
Mikro

1 l/ha

uzupełnienie
niedoborów, wpływ
na wzrost owoców

Wuxal Aminocal 3-5 l/ha + Wuxal Mikro 1 l/ha

wpływ na
właściwości
jakościowe
owoców,
dostarczenie
mikroelementów

W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu wegetacyjnego zaleca się stosować **Wuxal Ascofol 2-3 l/ha** lub **Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha**, jako biostymulator mający decydujący wpływ na regenerację roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)